

# BIÓPSIA DE RIM

**Paciente deve estar bem de saúde, sem febre, calmo, com acompanhante e com PA dentro de níveis seguros no momento da biópsia (< 160/100 mmHg).**

## **SUSPENDER COM 7 DIAS ANTES DO PROCEDIMENTO**

- Clopidogrel, Pradaxa, Xarelto, Aas, Marevan, Marcoumar, Ticlopidina, Pentoxifilina;
- Heparina pode ser suspensa com antecedência de 24h.

## **PACIENTE EXTERNO - TRAZER NO DIA DO EXAME**

- US de vias urinárias recentes (pelo menos 3 meses);
- Coagulograma recente (pelo menos 15 dias antes da biópsia): TAP, KPTT, Plaquetas, HB, HT;
- Pedido do médico (motivo da biópsia).

## **ORIENTAÇÕES GERAIS**

- Outras medicações de uso diário deverão ser tomadas normalmente;
- Não vir com adornos (anéis, relógio, corrente, pulseira, brinco e outros)
- Chegar com 30 minutos de antecedência;
- Após o procedimento, o paciente ficará em observação por algumas horas;
- Não vir de moto (motorista e nem garupa) e não conduzir nenhum meio de transporte; Não poderá dirigir em 24h após o procedimento.

**É indispensável trazer acompanhante maior de 18 anos e responsável.  
Sem acompanhante o exame não será realizado.**

### **Atenção:**

- Quando vier ao AME não se esqueça de trazer um documento oficial com foto, cartão SUS, encaminhamento ou pedido médico devidamente preenchido e assinado;
- Não se atrase! Venha no horário de chegada informado;
- Evite trazer crianças;
- Mantenha seu cadastro atualizado, principalmente o telefone de contato.